





## S14. Sairastavuusindeksi (Kymenlaakso)



Lähde: Kela, terveystunturi



## S14. Sairastavuusindeksi (Kymenlaakso)

**Arviointiperusteet:** Jokaiselle Suomen kunnalle laskettu sairastavuusindeksi ilmoittaa miten tervettä tai sairasta alueen väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Indeksillä koostetaan kolmesta muuttujasta: kuolleisuudesta, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuudesta työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuudesta koko väestöstä. Kukaan näistä muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon. Lopullinen indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo. Indeksillä on ikävakioidu, joten alueen ikärakenne ei vääristä alueiden välisiä vertailuja.

Kymenlaaksossa sairastavuusindeksin pitkän ajan kehitys on nouseva, kuitenkin viimeisinä vuosina vuodesta 2007 lähtien muutos on ollut pieni. Vuonna 2016 sairastavuusindeksi oli 107,5 (edellisvuonna 107,5). Maakunnan luku on maan keskiarvoa huonompi, ja maakuntien (ml. Ahvenanmaa) joukossa sijalla 13 (ei muutosta vuoteen 2015 verrattuna). Maan matalimmat arvot olivat Ahvenanmaalla (76,8), Uudellamaalla (87,2) ja Pohjanmaalla (89,9). Korkeimmat arvot olivat puolestaan Kainuussa (120,2), Pohjois-Savossa (119,9) ja Pohjois-Pohjanmaalla (114,8). Naapurimaakunnista Etelä-Savon (113,1) indeksi oli Kymenlaakson lukua korkeampi, Päijät-Hämeessä (100,8) ja Etelä-Karjalassa (102,6) matalampi. Vertailumaakuntana usein käytetyssä Satakunnassa indeksi (103,2) oli myös Kymenlaakson alapuolella.

Kuntien välillä on eroja. Kaikki maakunnan kunnat ylittivät maan keskiarvon. Pyhtäällä indeksi oli maakunnan matalin (100,3) ja parantunut hieman edellisvuodesta. Iitissä (101,1), Haminassa (105,4) Kouvolassa (107,9) ja Kotkassa (108,0) maakunnallinen keskiarvo ylitettiin niukasti. Virolahden indeksi 114,8 (edellisvuonna 116,7) oli toiseksi korkein. Selvästi huonoin tilanne oli Miehikkälässä: indeksi oli 125,7 (edellisvuonna 125,9).

Sairastavuutta voidaan sairastavuusindeksin ja sen osaindeksien lisäksi mitata myös sairauspäivärahaa saaneiden 16–64-vuotiaiden määrien avulla. Sairauspäivärahaa ei saa lyhyistä, alle 10 arkipäivää kestäneistä poissaoloista, (joita on kuitenkin selvästi enemmän kuin pitkiä). Muuttujaa voi käyttää ilmaisemaan pitkittynyttä työkyvyn alenemista ja ehkä myös tulevaa työkyvyttömyyttä. Koko maan tasolla tilanne parani vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna. Sairauspäivärahaa sai Suomessa 83,1 työikäistä tuhannesta vastaavan ikäisestä, vuotta aikaisemmin määrä oli 86,1. Kymenlaaksossa saajia oli selvästi maan keskimäärää enemmän: 97,8 (edellisvuonna 102,4). Maakuntien joukossa Kymenlaakson luku olikin koko maan kolmanneksi heikoin (pl. Ahvenanmaa). Eniten sairauspäivärahan saajia oli Kainuussa (103,2). Suuria suhdelukuja oli myös Keski-Pohjanmaalla (100,8) sekä Pohjois-Savossa (97,2). Matalimmat luvut olivat Uudellamaalla (68,8), Varsinais-Suomessa (81,2) sekä Keski-Suomessa (83,2).

**Indikaattorin kehittyminen:** Kymenlaaksossa indikaattorin S14 Sairastavuusindeksi on vaihdellut tasaisesti indeksilukujen 106 - 108 tienoilla. Kymenlaaksossa indikaattori S14 on kehittynyt vuoden 2010 jälkeen [heikompaan](#) suuntaan, kansallista tasoa [huonommin](#) indikaattorin tason oltua v. 2015 kansallista tasoa [heikompi](#).